

2023
5月号

No.123

営農情報誌

J Aレーク伊吹 経済部 営農企画課
TEL 0749-63-2101 FAX 0749-64-2085




ご不明な点があれば携帯までご連絡ください

田植後の水管理について

5月前半は気温の変化が大きいため、適正な水管理が重要となります。しっかり管理し早期に分げつを確保しましょう。

水管理のイメージ



! 田植えから2週間後、こんな症状が出たら注意しましょう。

- 葉色が薄い
- 下葉が黄色い
- 分げつしない
- 入るとブクブク泡が出る



この症状は還元障害の可能性ががあります！！

還元障害とは、作物残渣や雑草が分解されないまま田植えした場合に土中で酸素不足が発生し、水稻の生育に有害なガス（メタンガス、硫化水素）が発生して生育が抑制されている状態のことです。

初期症状 ・下葉が黄色い ・葉色が出ない ・分げつしない ・田植時と変わらない

対策

➡ ・自然落水し数日間、田面が出る程度で軽く干します。

改善しない ・分げつしない・下葉が黄色い又は赤い斑点が発生・根が張らない・土中から匂いがする

対策

➡ ・硫酸マグネシウム・マルチサポート2号を10aあたり20kg施用
・溝切り作業を早めにして田面を干す。

還元障害が出やすい圃場では、収穫後出来るだけ早く秋耕することにより、作物残渣の分解を早めることが重要です。



中干しについて

品質向上のため適切な時期に中干しを行いましょう。

中干しの目的

- ・根を活性化させる。
- ・過剰な分げつを抑制する。
- ・籾数制限により粒・整粒の歩合向上
- ・刈取りなどの作業性を高める。


中干しのタイミング

- ・田植え後約1カ月を目安に5日から2週間程度

中干しのポイント

- ・軽く足跡がつく程度までしっかりと
- ・大きなひび割れを起こさない程度に
- ・過度の中干しは根を痛めたり、水田の水持ちを悪くする原因になる。

中干しの程度



半湿田では足がしずむ程度 乾田では弱いヒビが入る程度

中干し時期の茎数(コシヒカリのめやす)

栽植密度(・坪)	50株	60株	70株
1株当たりの茎数	20本	17本	14本

農業用廃プラスチック類回収のご案内

日時	場所	持ち物
令和5年5月27日(土) 9:00~11:30	伊吹カントリーエレベーター 神照カントリーエレベーター	▶ 委任状兼口座振替依頼書には必要事項を記入し、通帳届出印を押印のうえ、お持ちください！
令和5年6月3日(土) 9:00~11:30	近江カントリーエレベーター 長浜カントリーエレベーター	

【対象となるプラスチック類】 ● 農業用ポリ ● 畔波シート ● 育苗箱 ● 肥料袋 など

◆ 金属類・廃タイヤ・農薬のガラス瓶や中身が残っている肥料袋などは回収不可です。

◆ 運搬車両の両側面に別紙『産業廃棄物収集運搬車 氏名〇〇』の表示をお願いします。